

ИМПЛАНТАЦИЯ

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА

Чтобы результат лечения продлился долгое время, необходима постоянная и тщательная гигиена полости рта. Врагом имплантата является зубной налет. И есть только одно решение в борьбе с ним – чистить зубы после приема пищи, по утрам и перед сном.

Заживление в полости рта проходит быстро. В первые пару дней область операции может быть болезненной и немного кровоточить. Также может возникнуть отек. Следует избегать влажных компрессов на щеку оперированной стороны. Это увеличит отечность тканей. Если рана кровоточит, свяжитесь со своим зубным врачом. Швы снимут через 1-2 недели. После операции в рот ставятся марлевые тампоны, которые необходимо держать ~30 минут. Так останавливается первое кровотечение.

Операция проводится обычно под местной анестезией. Поскольку анестетик способствует возникновению головокружения и сонливости, не рекомендуется после операции самому садиться за руль.

После операции лучше воздержаться от горячей пищи и напитков до конца действия анестезии, поскольку слизистая оболочка полости рта ничего не чувствует и ее можно легко обжечь.

Если вы носите съемный протез на той челюсти, в области которой проходила операция, обязательно уточните, когда можно начать носить протез снова. После легкой операции имеющийся протез корректируется так, чтобы вы смогли сразу же его использовать. В случае более тяжелых операций (пр., пересадка кости) съемный протез нельзя носить до 6 месяцев.

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА

1. Исключить физическую нагрузку (спорт, поход, баня, поднятие тяжестей).
2. В течение первых двух дней после операции не пить кофе, крепкого чая, молочных продуктов и алкоголь.
3. Не курить.
4. После каждого приема пищи полоскать рот чуть теплой водой.
5. Чистить регулярно десна и зубы, область имплантата чистить особенно нежно и аккуратно.
6. Не использовать электрическую зубную щетку и устройство для чистки межзубных промежутков под давлением воды.
7. В течение первых двух дней после операции прикладывать холод к области имплантата. Не прикладывать лед непосредственно к коже, лучше всего завернуть его в полотенце. Не держите лед дольше 20 минут.

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 4-6 НЕДЕЛЬ

1. Избегать физических нагрузок
2. Чистить зубы, десна и имплантаты, следуя предписаниям врача
3. Не курить
4. Носить постоянно временный протез (коронка, шина, съемный пластиночный протез). Чистить его после каждого приема пищи.

Заживление возможно только при условии, что имплантат правильно расположен в кости. Поэтому необходимо следить, чтобы не перегружать область имплантата во время еды. Также нельзя постоянно трогать область имплантата языком или пальцами. Период заживления длится ~ 6 месяцев. Если была осуществлена пересадка кости, то заживление займет 9 месяцев или дольше. Действительное время выздоровления зависит от вашего собственного организма (деятельность иммунной системы, скорость регенеративных процессов и т.д.).

После заживления (~ 6-12 месяцев), когда имплантат надежно закреплен в кости, проводится окончательная реставрация.

Во время первого визита изготавливается слепок зубов. Для этого используется резиноподобный материал, который выкладывается на специальную ложку и вводится в рот. На основе этой модели зубной техник выполняет окончательную работу, будь это коронка, мост или съемный протез.