

ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

ПРОЦЕДУРА

Лечение корневых каналов – это сложная и требующая времени процедура. Часто зуб имеет несколько корневых каналов (от одного до четырех) и доступ к задним зубам может быть затруднен. Лечение корневых каналов предполагает, как правило, несколько визитов, в ходе которых корневые каналы промываются, чистятся, и в зуб ставится лекарство, дезинфицирующее каналы.

После антисептической обработки каналов корневой канал герметически заполняется, и коронковая часть зуба восстанавливается пломбой. В случае, если большая часть своего зуба разрушена, для опоры коронковой части в канал устанавливается специальный стекловолоконный штифт или изготовленная в лаборатории литая штифтовая вкладка, на которую цементируется изготовленная в зубной лаборатории коронка.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Зуб, в котором лечатся корневые каналы, может в первые дни после процедуры быть немного чувствительным при накусывании и/или болезненно поднимать. В таком случае стоит принять обезболивающее. Обычно боли проходят в течение нескольких дней после осуществления лечения корневых каналов.

Если на зуб поставлена временная пломба, следует избегать приема пищи в течение 1 часа. Было бы хорошо не кусать этим зубом очень твердую пищу (орехи и т.п.).

В ходе текущего лечения корней зубы при накусывании более восприимчивы к нагрузке и могут сломаться. Чем меньше от зуба сохранилось своей ткани, тем больше вероятность разрушения. Если выпала временная пломба или скололась зубная стенка, следует немедленно обратиться к зубному врачу, который поставит новую пломбу, чтобы микробы не попали в корневой канал.

В случае острого воспаления боль и жалобы могут не пропасть сразу после посещения врача. Также ранее не причинявший беспокойства с хроническим воспалением корня зуб может после начала корневого лечения доставлять чувство дискомфорта, быть чувствительным, причинять сильную боль и даже может опухнуть. В таком случае врач может посчитать необходимым прописать антибиотики и сильнодействующие обезболивающие.

Если зуб девитализирован (т.е. умертвлен) и произведено заполнение каналов, то следует, несмотря на отсутствие боли или чувствительности, примерно год спустя проверить зуб и сделать контрольный рентген. И в дальнейшем рекомендуется через каждые пару лет делать контрольные рентгеновские снимки, чтобы убедиться в успешности лечения.

При возникновении острой боли, припухлости, температуры или иного болезненного симптома следует немедленно прийти к врачу на осмотр зуба или по крайней мере позвонить в клинику для получения дальнейших указаний.